



LA SÍFILIS

PREGUNTAS FRECUENTES

El número de casos de sífilis temprana (etapas primaria, secundaria y latente temprana) han seguido aumentando en Houston y el Condado de Harris desde el 2020. En los últimos (4) años, el porcentaje de casos entre mujeres ha aumentado más del 128%. Este incremento ha contribuido al aumento de la sífilis congénita, con una cantidad de casos en el 2021 de nueve (9) veces mayor a la del 2016. Los habitantes de Houston, especialmente las poblaciones vulnerables, los fetos y los bebés, pueden protegerse mediante pruebas y tratamientos adecuados para las infecciones por sífilis.

¿Qué es la sífilis?

La sífilis es una infección bacteriana de transmisión sexual (ITS) que puede causar graves problemas de salud si no se trata. La infección se desarrolla en etapas (primaria, secundaria, latente y terciaria). Cada etapa puede tener diferentes signos y síntomas.

¿Quién debe hacerse la prueba?

- Las mujeres embarazadas deben hacerse la prueba en el primer y tercer trimestre.
- Personas que tienen contacto sexual sin protección
- Hombres que practican sexo anónimo
- Personas con múltiples parejas sexuales
- Personas recientemente diagnosticadas con cualquier otra enfermedad de transmisión sexual como gonorrea, clamidia o VIH.

¿Cuáles son los signos y síntomas de la sífilis?

Hay cuatro etapas de la sífilis (primaria, secundaria, latente y terciaria) y cada una de ellas tiene diferentes signos y síntomas.

Etapa Primaria

Durante la primera etapa (primaria) de la sífilis, es posible que notes una sola llaga o varias llagas. La llaga es el lugar por donde la sífilis entró en el cuerpo. Estas llagas generalmente ocurren en, sobre o alrededor de las siguientes partes del cuerpo:

- pene
- vagina
- labios
- ano
- recto
- boca

Las llagas suelen ser (pero no siempre) firmes, redondas e indoloras. Debido a que la llaga es indolora, es posible que no la note. La llaga suele durar de 3 a 6 semanas; y sana independientemente de si recibe tratamiento o no. Incluso después de que la llaga desaparezca, usted debe recibir tratamiento. Esto evitará que su infección pase a la etapa secundaria.

Continúa >>



Etapa Secundaria

Durante la etapa secundaria, es posible que tenga erupciones en la piel y/o llagas en la boca, la vagina o el ano. Esta etapa generalmente comienza con una erupción en una o más áreas del cuerpo. La erupción puede aparecer cuando la llaga principal se está curando o varias semanas después de que la llaga se haya curado. La erupción puede estar en las palmas de las manos y/o en la planta de los pies y puede verse de las siguientes formas:

- áspera
- rojiza
- marrón rojizo

El sarpullido por lo general no pica y, a veces, es tan leve que no se nota. Otros síntomas pueden incluir:

- fiebre
- glándulas linfáticas inflamadas
- dolor de garganta
- pérdida de cabello irregular
- dolores de cabeza
- pérdida de peso
- dolores musculares
- fatiga (sentirse muy cansado)

Los síntomas de esta etapa desaparecerán si recibe tratamiento. Sin el tratamiento adecuado, su infección pasará a las etapas latente y posiblemente terciaria de la sífilis.

Etapa Latente

La etapa latente de la sífilis es un período en el que no hay signos o síntomas visibles. Sin tratamiento, puede continuar teniendo sífilis en su cuerpo durante años.

Etapa Terciaria

La mayoría de las personas con sífilis sin tratar no desarrolla sífilis terciaria. Sin embargo, cuando sucede, esta puede afectar muchos de los sistemas de diferentes órganos. Estos incluyen el corazón, los vasos sanguíneos, el cerebro y el sistema nervioso. La sífilis terciaria es muy grave y puede ocurrir entre 10 y 30 años después del comienzo de la infección. En la sífilis terciaria, la enfermedad daña los órganos internos y puede provocar la muerte. Un proveedor de atención médica generalmente puede diagnosticar la sífilis terciaria con la ayuda de múltiples pruebas.

Se aceptan visitas sin cita previa. Para encontrar la ubicación más cercana a usted, llame al 832-393-5427. Los proveedores médicos pueden informar sobre los casos de sífilis llamando al: 855-264-8463.

¿Existe una cura para la sífilis?

Sí, la sífilis se puede curar con los antibióticos correctos que su médico le provea. Sin embargo, es posible que el tratamiento no pueda remediar ningún daño que la infección pueda causar.

¿Cómo las personas contraen la sífilis?

La sífilis se transmite de persona a persona a través del contacto directo con una llaga por sífilis. Las llagas se producen principalmente en los genitales externos, la vagina, el ano o el recto. Las llagas también pueden ocurrir en los labios y en la boca.

La transmisión de la sífilis se produce durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Las mujeres embarazadas que tienen la enfermedad pueden transmitirla a sus bebés que aún no nacen.

La sífilis no se puede contagiar a través del contacto con los asientos de los inodoros, las perillas de las puertas, las piscinas, los jacuzzis, las bañeras, la ropa compartida o los utensilios para comer.

¿Dónde puedo hacerme la prueba para la sífilis?

El Departamento de Salud de Houston ofrece pruebas de sífilis en tres de sus centros de salud:

Northside Health Center

8504 Schuller Rd.,
Houston, Texas 77093

Sharpstown Health Center

6201 Bonhomme Rd.,
Houston, Texas 77036

Sunnyside Health Center

4410 Reed Rd.
Houston, Texas 77051

Para obtener más información y ubicación de servicio escanee aquí.

