

## ¿QUÉ ES LA SÍFILIS?

La sífilis es una ITS (infección de transmisión sexual) grave que puede causar daños a largo plazo en el cuerpo si no se trata. Puede transmitirse al tener contacto sexual con el pene, la vagina, la boca o el ano de una persona con sífilis. Los antibióticos pueden curar la sífilis, pero no el daño ya causado por la infección.

## ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA SÍFILIS?

La sífilis a menudo comienza con una llaga en el lugar donde ingreso al cuerpo. La llaga ocurre principalmente en o cerca del pene, la vagina, la boca o el ano. La llaga no duele y desaparece sin tratamiento después de algunas semanas. Algunas personas ni siquiera la notan. Pero aún pueden transmitir la enfermedad y causar daño.

Otros síntomas después incluyen:

- Erupciones en las palmas de las manos y las plantas de los pies, el pecho, la espalda o alrededor de los genitales o el ano.
- Pérdida de cabello
- Dolores de cabeza, fiebre y dolor de garganta. Al igual que la llaga, estos síntomas desaparecen sin tratamiento, pero la persona continúa teniendo sífilis. Si no se trata, la infección puede causar problemas de salud graves como artritis, enfermedades cardíacas, problemas del sistema nervioso, demencia, ceguera e incluso la muerte.

## ¿DÓNDE ME HAGO LA PRUEBA?

Citas: 832-393-5427

### Centro de Salud y Múltiservicios de Sunnyside

4410 Reed Rd., Houston, Texas 77051  
 832-395-0069

Lunes: 9 a.m.-6 p.m.

Martes, jueves, y viernes: 8 a.m.-5 p.m.,  
 Miércoles: 8 a.m.-12 p.m.

### Centro de salud del Northside

8504 Schuller Rd., Houston, Texas 77093  
 832-395-9100

Lunes: 8:30 a.m. – 6 p.m.,

Martes – jueves: 7:30 a.m. – 5 p.m.

Viernes: 7:30 a.m.– 12 p.m.

Segundo miércoles por la tarde de cada mes: cerrado

### Centro de salud de Sharpstown

6201 Bonhomme Rd., Houston, Texas 77036  
 832-393-9800

Lunes: 8:30 a.m. – 6 p.m.,

Martes – jueves: 7:30 a.m.– 5 p.m.,

Viernes: 7:30 a.m. – 12 p.m.

Segundo miércoles por la tarde de cada mes: cerrado

Para preguntas sobre VIH/ITS,  
 llame al 800-CDC-INFO (inglés/español)  
 888-232-6348 (TTY) o 7-1-1

Se recomienda la reproducción de este folleto; sin embargo, las copias no se pueden vender y se debe citar al Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas como la fuente de esta información.

## LO QUE DEBE SABER SOBRE LA SÍFILIS





## ¿DEBERÍA REALIZARSE UNA PRUEBA DE SÍFILIS?

Debe hacerse la prueba si usted o alguien con quien tiene relaciones sexuales presenta síntomas. Si cree que tiene sífilis, hágase la prueba en el consultorio de su médico o en una clínica de ITS. Los análisis de sangre simples pueden indicar si tiene una infección. Puede tener sífilis sin síntomas, así que hágase la prueba si tiene relaciones sexuales sin condones.

Si tiene sífilis, siga los consejos del médico sobre cómo tomar medicamentos. Dígale a cualquier persona con la que haya tenido relaciones sexuales que se haga la prueba. El Departamento de Salud puede ayudarlo a contactar a las personas si así lo desea.

## ¿QUÉ PASA CON LA SÍFILIS DURANTE EL EMBARAZO?

Una mujer embarazada puede transmitir la sífilis a su hijo por nacer. La sífilis no tratada puede causar muerte fetal (un bebé que nace muerto), parto prematuro y discapacidades graves. La ley de Texas requiere que los médicos realicen pruebas a todas las mujeres embarazadas en su primera visita prenatal, en el tercer trimestre y nuevamente al momento del parto.

Una mujer embarazada que da positivo por sífilis, debe recibir tratamiento inmediatamente. La penicilina es el único tratamiento disponible para una mujer embarazada con sífilis.

## LA SÍFILIS Y EL VIH

A person with syphilis is at higher risk for Una persona con sífilis tiene un mayor riesgo de contraer el VIH. La llaga puede proporcionar un punto de entrada para el VIH y otras ITS. Cuando te hagas la prueba de sífilis, también debes pedir que te hagan la prueba del VIH y otras ITS.

## PREVENCIÓN DE LA SÍFILIS

La única forma segura de evitar la sífilis y otras ITS es no tener relaciones sexuales. El sexo vaginal, oral y anal puede transmitir la sífilis y otras ITS.

Si tiene relaciones sexuales, use un condón de látex cada vez. Cuando se usan correctamente, los condones pueden detener la propagación de la sífilis al evitar el contacto con la llaga. Tenga en cuenta que las llagas de la sífilis pueden aparecer fuera del área que cubre un condón.

El quedarse con una pareja que solo tenga relaciones sexuales con usted también puede ayudar a prevenir las ITS. Use condón a menos de que las pruebas muestren que usted y su pareja no tienen ninguna ITS.

## ¿DÓNDE PUEDO APRENDER MÁS?

Muchas clínicas de salud pública brindan pruebas y tratamientos de ITS a bajo costo o sin costo alguno. Su nombre y registros de salud se mantienen privados.

Para más información y ubicaciones de servicio

